

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

Əlyazması hüququnda

**PSIXOAKTIV MADDƏ İSTİFADƏÇİLƏRİNİN
SOSIAL-PSIXOLOJİ REABİLİTASIYASI**

İxtisas: 611401-“Sosial psixologiya”

Elm sahəsi: Psixologiya

İddiaçı: **Ramin Fazil oğlu Allahverdiyev**

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş
dissertasiyanın

AVTOREFERATI

Bakı-2025

Dissertasiya işi Bakı Dövlət Universitetinin sosial və pedaqoji psixologiya kafedrasında yerinə yetirilmişdir.

Elmi rəhbər: psixologiya elmləri doktoru, professor
Elnarə İbrahim qızı Şəfiyeva



Rəsmi opponentlər: psixologiya elmləri doktoru, professor
Gülmar Kazım qızı Qurbanova

psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Südəbə Novruzəli qızı Hüseynova

psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Afərim Əli qızı Abbasova

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.43 Dissertasiya şurası

Dissertasiya şurasının
sədri:

psixologiya elmləri doktoru, professor
Kamilə Ramiz qızı Əliyeva

Dissertasiya şurasının
elmi katibi:

psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Müşviq Hüseyn oğlu Mustafayev

Elmi seminarın sədri:

psixologiya elmləri doktoru, professor
Rəna Həmid qızı Qədirova



GİRİŞ

Mövzunun aktuallığı və işlənmə səviyyəsi. Müasir dünyada cəmiyyətin inkişafı ilə bağlı meydana çıxan və qloballaşan bir sıra asılılıqlar, insanların fiziki sağlamlığı ilə yanaşı, psixoloji sağlamlığını da təhlükə altına almışdır. Belə problemlər nəinki psixologiyanın, eyni zamanda cəmiyyətin və insanlığın global problemlərindən biridir. Son illərin statistikasına göstərir ki, psixoaktiv maddələrdən istifadə edən şəxslərin sayı durmadan artır. Qeyd edək ki, müasir dövrün bəlası sayılan psixoaktiv maddələrdən istifadə bütün sahələrə nüfuz edərək, ictimai həyatın ritminə mənfi təsir göstərir. Hazırda bəşəriyyətin ən təhlükəli problemi olan psixoaktiv maddələrdən istifadə bütün dünyanın diqqətini özünə cəlb etmişdir. Bu baxımdan onunla mübarizə aparmaq, onun aradan qaldırılması yollarını müəyyənləşdirmək bu gün bütün bəşəriyyətin qarşısında duran çox mühüm məsələlərdən biri hesab olunur.

Qeyd edək ki, psixoaktiv maddə istifadəçiləri ilə aparılan mübarizənin dövlət əhəmiyyətli məsələ hesab olunması təsadüfi deyil. Onların hesabına fabrik və zavodlar, müəssisə və idarələr, bütünlükdə isə dövlət böyük maddi zərər çəkir. Narkotik vasitələrdən sui-istifadə edən şəxslərdə əməyin məhsuldarlığı azalır, ümumilikdə isə əməyə, işə, ailəyə, dostlara qarşı maraq tamamilə itmiş olur. Bütün bunlar günü-gündən artmaqda olan psixoaktiv maddə istifadəçilərinin ən vacib əlamətləri hesab olunur.

Psixoaktiv maddə istifadəçilərinə psixoloji və fizioloji dəyişmələr yaranır ki, bunun da nəticəsində psixoaktiv maddə istifadəçilərinin davranışında problemlər meydana gəlir. Bu da onların davranışında dəyişkən emosionalılıqla, qeyri-adekvat emosional reaksiyalarla, gözlənilməz əhval-ruhiyyə, əsəbilik və aqressiya ilə müşahidə olunan çox ciddi problemlərin baş verməsinə gətirib çıxarır. Belə vəziyyət isə qarşılıqlı münasibətlərdə çətinlik, münaqişə, mübahisə və başqa aqressiv davranışların yaranmasına səbəb olur.¹

Son zamanlar zərərli maddələrin istifadəsinin geniş vüsət alması və onun bioloji, sosial və psixoloji cəhətdən təsir mexanizmlərinin müəyyən olunması maddə istifadəçiləri ilə rehabilitasiya işinin zəruri-

¹ Miller, W.R., Carroll, K.M. The Cambridge Handbook of Substance and Behavioral Addictions. // Cambridge University Press. -2020. -p.12-13.

liyini aktuallaşdırmışdır. Mütəxəssislər böyük araşdırmalar nəticəsində ortaqlar fikrə gələrək, psixoaktiv maddə istifadəçisi ilə reabilitasiya prosesinin psixoaktiv maddəyə qarşı deyil, maddə istifadəçisinin psixoaktiv maddə qəbul etdiyi zaman xoş hiss və fantaziyalar dünyasında, həqiqi həyatdan qaçaraq gizlənməsi qorxusuna qarşı, yəni motivasiya sferasının və sosial-psixoloji problemlərinin həllinin tapılıb, mövcud vəziyyətin korreksiya edilməsi işinə yönəldilməli olduğunu müəyyən etmiş oldular. Buna görə psixoaktiv maddə asılılığı olan xəstələrin tibbi, sosial və psixoloji reabilitasiyası narkologiyanın prioritet sahələrindən biridir.

Aparılmış tədqiqatların təhlilindən aydın olur ki, psixoaktiv maddə istifadəçilərinin sosial-psixoloji reabilitasiyası müxtəlif aspektlərdə araşdırılmışdır. Problemlə bağlı mövcud ədəbiyyatın təhlilindən çıxış edib, üç istiqamət fərqləndirmək olar:

1. Tibbi istiqamətdə aparılan tədqiqatlar;
2. Klinik psixologiya və psixoterapevtik istiqamətdə aparılan tədqiqatlar;
3. Sosial-psixoloji istiqamətdə aparılan tədqiqatlar.

Bütün istiqamətlərdə aparılmış tədqiqatlar nəticəsində, demək olar ki, problemin ayrı-ayrı cəhətləri diqqət mərkəzinə gətirilərək, onun təzahürünün və fəsadlarının səviyyəsi öyrənilmişdir.

Birinci istiqamətdə aparılmış tədqiqatlarda bu problemin etimologiyası və gedişi, onun yarada biləcəyi fəsadlar diqqət mərkəzinə gətirilmişdir.

İkinci istiqamət klinik psixologiyada və psixoterapiyada aparılmış tədqiqatlardır. Bu tədqiqatlarda, əsasən, psixoaktiv maddə istifadəçilərinə göstərilən psixoloji yardım və bu prosesdə effektiv olan terapiya metodlarının roluna toxunulmuşdur.

Üçüncü istiqamət isə, daha çox, sosial-psixoloji istiqamətdə aparılmış tədqiqatlardır. Burada başlıca məsələ psixoaktiv maddədən istifadə etməyə səbəb olan sosial-psixoloji amillərin roluna diqqət yetirilmişdir.

Tədqiqat prosesində görkəmli alimlərimizdən Ə.S.Bayramov, M.Ə.Həmzəyev, Ə.Ə.Əlizadə, B.H.Əliyev, R.Ə.Cavadov, S.İ.Seyidov, R.İ.Əliyev, E.İ.Şəfiyeva, R.H.Qədirova, R.V.Cabbarov, M.H.Mustafayev və başqalarının əsərlərindən bəhrələnmiş, onlardan

baza sistem kimi istifadə etmişik. Psixoaktiv maddələrdən asılılıq probleminin və sosial-psixoloji reabilitasiya prosesinin öyrənilməsi zamanı V.M.Bexterev, F.V.Basin, B.D.Karvasarskiy tərəfindən tir-yək istifadəçisi olan şəxsiyyətin tədqiqinə sistemli yanaşma, B.Q.Ananyev, A.A.Bodalyov, V.V.Kozlov, V.V.Novinkov tərəfindən reabilitasiya prosesinə fəaliyyət və integrativ yanaşmalar, E.Liçko, V.V.Stolin tərəfindən şəxsiyyətin diaqnostikasına kompleks yanaşma, 1990-cı ildə T.A.Donskix; 1976, 1978, 1990-cı illərdə T.P.Korolenko; 1998-ci ildə L.Q.Leonov, N.L.Boçkaryov, 1988-ci ildə C.Nakken; 1988-ci ildə Schaef A.F, Fassel D; 1988-ci ildə Segal B; 1990-cı ildə Moody G tərəfindən psixoaktiv maddələrdən asılılığa addiktiv davranış növü kimi yanaşma (bu yanaşma çərçivəsində psixoaktiv maddələrdən istifadəyə şəxsiyyətin xoşagəlməz psixi vəziyyətləri özü-özlüyündə tənzimləməsi üsulu kimi baxılmışdır) işlənib-hazırlanmış, 1975-ci ildə Y.E.Sosnovikov; 1997-ci ildə T.M.Maryutin, O.Y.Yermolayev tərəfindən funksional vəziyyətlərin müəyyən struktura malik sistemli hadisələr olması barədə, 1995-ci ildə O.S.Kopina, E.A.Suslova, E.V.Zaikin tərəfindən psixoemosional gərginlik vəziyyətlərinin strukturunda mənfi affekt əlamətlərinin (frustrasiya, stress, həyəcan, depressiya) üstünlük təşkil etdiyi müxtəlif xoşagəlməz emosional vəziyyətlərin təzahürü olması barədə təsəvvürlər formalaşdırılmışdır.¹

Tədqiqatın obyektı və predmeti. Tədqiqatın obyektini sosial-psixoloji reabilitasiya prosesi təşkil edir. Tədqiqatın predmetini isə psixoaktiv maddələrdən asılı olanların reabilitasiya prosesinin qanunauyğunluqları və təzahür xüsusiyyətləri təşkil edir.

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Tədqiqatda qarşıya qoyulmuş başlıca məqsəd xüsusi metodikaların, psixoloji eksperimentlərin köməyi ilə psixoaktiv maddələrdən asılı olanların şəxsiyyət xüsusiyyətləri ilə davranışının təhlili və bununla bağlı tövsiyələr hazırlamaqdan ibarətdir. Məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı vəzifələr müəyyən edilmişdir:

1. Psixoaktiv maddələrdən asılı olanlardan ibarət tədqiqat qru-

¹ Mustafayev, M.H., Allahverdiyev, R.F. Psixoaktiv maddə istifadəçilərinin sosial-psixoloji reabilitasiyasında həyata keçirilən terapiya üsulları və müasir yanaşmalar.// -Bakı: Bakı Dövlət Universiteti, Psixologiya jurnalı. -2020. –s.55-65.

puna daxil olan şəxslərin sosial-psixoloji xüsusiyyətlərinin, onların sosial-psixoloji reabilitasiyasına imkan yaradan sosial-psixoloji şəraitlərin öyrənilməsi.

2. Psixoaktiv maddələrdən asılı olanlardan ibarət tədqiqat qrupunda destruktiv şəxsiyyət dəyişikliklərinin meyarlarının aşkar edilməsi:

1. Sosial-psixoloji reabilitasiya prosesində şəxsiyyətin sosiallaşmasının və sosial dəyərlərinin formalaşma dinamikasının tədqiq edilməsi.

2. Psixoaktiv maddələrdən asılı olanların psixoloji müşayiət edilməsi üzrə proqramın işlənib-hazırlanması və onun stasionar şəraitdə reallaşdırılması üzrə metodik tövsiyələrin irəli sürülməsi.

Tədqiqatın fərziyyəsi. Sosial-psixoloji reabilitasiya prosesində şəxsiyyətin sosiallaşması və harmonik şəxsiyyətlərarası münasibətlər qurması üçün şərait yaradır.

Tədqiqat gedişində bu əsas fərziyyə ilə yanaşı, bəzi əlavə fərziyyələr də irəli sürülmüşdür:

- Sosial-psixoloji reabilitasiya prosesi destruktiv şəxsiyyət dəyişikliklərini aradan qaldırmağa kömək edir.

- Psixoaktiv maddələrdən asılı olan şəxslər qrupunda aktiv sosial-psixoloji metodlardan istifadə edilməsi səmərəli qarşılıqlı təsirin formalaşmasına şərait yaradır.

- Spesifik sosial-psixoloji reabilitasiya gedişində konstruktiv şəxsiyyətin inkişafının kompensator sistemi formalaşır.

Tədqiqatın məqsədi və irəli sürülmüş fərziyyələri işin aşağıdakı vəzifələrinin müəyyən edilməsinə imkan verir:

1. Psixoaktiv maddələrdən asılılıq probleminə həsr olunmuş müxtəlif tədqiqat işlərinin və elmi ədəbiyyat nümunələrinin, eləcə də sosial-psixoloji reabilitasiya üzrə praktik proqramların və metodların konseptual şəkildə təhlil edilməsi.

2. Psixoaktiv maddələrdən asılı olanlardan ibarət tədqiqat qrupuna daxil olan şəxslərin sosial-psixoloji xüsusiyyətlərinin, onların sosial-psixoloji reabilitasiyasına imkan yaradan sosial-psixoloji şəraitlərin öyrənilməsi.

3. Psixoaktiv maddələrdən asılı olanlardan ibarət tədqiqat qrupunda destruktiv şəxsiyyət dəyişikliklərinin meyarlarının aşkar edilməsi.

4. Sosial-psixoloji reabilitasiya prosesində şəxsiyyətin sosial-

laşmasının və sosial dəyərlərinin formalaşma dinamikasının tədqiq edilməsi.

5. Psixoaktiv maddələrdən asılı olanların psixoloji müşayiət edilməsi üzrə proqramın işlənib-hazırlanması və onun stasionar şəraitdə reallaşdırılması üzrə metodik tövsiyələrin irəli sürülməsi.

Tədqiqatın metodları. Tədqiqat prosesində psixoaktiv maddələrdən asılı olanların sosial-psixoloji reabilitasiyası probleminin tədqiqi ilə bağlı konkret vəzifələri həyata keçirmək üçün zəruri metodlardan müşahidə, psixoaktiv maddələrdən asılı olan şəxslərlə anket sorğusu, koqnitiv davranış terapiyalarından, nəticələrin kəmiyyət və keyfiyyət təhlili üsullarından istifadə edilmişdir.

Tədqiqatda Bakı şəhərində yerləşən Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Respublika Narkoloji Mərkəzində stasionar şəraitdə müalicə alan 18-55 yaş aralığında 200 nəfər psixoaktiv maddələrdən asılı olan şəxs iştirak etmişdir. Sonda əldə edilmiş nəticələrin kəmiyyət və keyfiyyət təhlili aparılmış, yekun nəticələrin işlənilməsində SPSS-21 riyazi-statistik proqramından istifadə edilmişdir.

Tədqiqatın elmi yeniliyi. Azərbaycanda ilk dəfə psixoaktiv maddə istifadəçilərinin davranışı sosial psixoloji aspektdə araşdırılır, psixoaktiv maddədən istifadənin yaranma səbəbləri, onun psixika, davranış və münasibətlər sisteminə təsiri öyrənilir, aradan qaldırılmasının səmərəli yolları müəyyənləşdirilir.

Psixoaktiv maddələrdən asılı olma səbəblərinə və şəxsiyyətin psixoloji statusundakı dəyişikliklərə olan elmi yanaşmalar reabilitasiya işində onlardan istifadə olunması baxımından sistemləşdirilmiş və təhlil edilmişdir. Azərbaycanda psixoaktiv maddələrdən asılı olan şəxslərin sosial-psixoloji reabilitasiyanın sistemli təhlili aparılmış, sosial-psixoloji reabilitasiyanın pozitiv və neqativ profilləri aşkar edilmişdir.

Psixoaktiv maddələrdən asılı olanlara səmərəli reabilitasiya yardımının göstərilməsi üzrə istiqamətlərin axtarılması və aşkar edilməsi məqsədilə nəzəri materialların və korreksiya-reabilitasiya işləri üzrə xarici təcrübənin təhlili həyata keçirilmiş, bu cür işlərin ümumi prinsipləri müəyyən edilmişdir. Stasionar şəraitdə psixoaktiv maddələrdən asılı olanlarla reabilitasiya işinin ümumi prinsipləri reabilitasiya prosesinin bütün iştirakçılarının şəxsiyyət sferalarındakı mövcud resurslara təsirinə əsaslanır.

– Azərbaycanda stasionar şəraitdə müalicə alan, psixoaktiv maddələrdən asılı olan şəxslərin sosial-psixoloji xüsusiyyətlərinin kompleks analizi həyata keçirilmişdir ki, bu da reabilitasiya prosesinin icra edilməsi imkanlarının genişləndirilməsi üçün şərait yaradır. Reabilitasiya işinin ənənəvi istiqamətlərindən (şəxsiyyətin emosional və iradi sferalarının korreksiyası) başqa, psixoaktiv maddələrdən asılı olan xəstələrin idraki aktivliyini də inkişaf etdirməyin zəruri olduğu sübut edilmişdir.

– Aşkar edilən sosial-psixoloji reabilitasiya istiqamətlərinin əsasında psixoaktiv maddələrdən asılı olan şəxslərin ilkin mərhələdə stasionar şəraitdə müalicə alma prosesinin sosial-psixoloji müşayiəti üzrə proqram işlənib-hazırlanmışdır. Proqramın əsasını koqnitiv-idraki yanaşma təşkil edir ki, bu da, öz növbəsində, şəxsiyyətin öz potensialını və özünütdəqiq sahəsində müxtəlif davranış formalarını mənimsəməklə, öz idraki aktivliyini artırmağa hazır olmasının dərk etməsindən ibarətdir.

– Psixoaktiv maddələrdən asılı olan şəxslər qrupunda reallaşdırılan sosial-psixoloji reabilitasiya prosesində şəxsiyyət dəyişikliklərinin dinamikası və şəxsiyyətlərarası münasibətlərin ahəngdarlığı müəyyən edilmişdir.

– Reabilitasiya mərkəzində psixoaktiv maddələrdən asılı olan şəxslərdə şəxsiyyətin inkişafının və konstruktiv şəxsiyyətlərarası münasibətlərin öyrənilməsinin müqayisəli təhlili həyata keçirilmişdir.

Müdafiəyə təqdim edilən müddəalar:

1. Şəxsiyyətin psixoaktiv maddələrdən asılılıq prosesi psixi, sosial və pedaqoji amillərlə şərtlənir. Psixoaktiv maddələrdən asılı olan fərd həyat fəaliyyətinin bütün səviyyələrində: orqanizm, psixika, sosial-psixoloji sfera, bilik, bacarıq və vərdişlərlə bağlı zədələrə məruz qalır. Bu səbəbdən də səmərəli sosial-psixoloji reabilitasiya sistemi bütün zədələnmiş səviyyələrə təsir göstərə bilən bərpaedici tədbirləri əhatə etməlidir. Şəxsiyyətin və onun mövcud olduğu mühitin korreksiyasına sistemli yanaşma psixoaktiv maddələrdən asılılığın psixoloji strukturuna daha adekvat təsir göstərir.

2. Psixoaktiv maddələrdən asılı olanların öz sosial-psixoloji potensialını və imkanlarını dərk etməsi, onlardan özünü və situasiyaları dəyişmək üçün istifadə etməsi praktik reabilitasiya işinin əsasını təşkil etməlidir.

3. Psixoaktiv maddələrdən asılı olan şəxsiyyətin strukturunda aşağıdakılar baş verir:

- idraki sferada: digər idrak proseslərinin qorunub-saxlanmasının ümumi fonunda hafizə və təfəkkürün zəifləməsi;
- iradi sferada: fərdi özünütənzimləmə prosesinin pozulması;
- emosional sferanın kəskin pozulması;
- psixofizioloji özünütənzimləmə sisteminin pozulması;
- “Mən-konsepsiya”nın pozulması və buna paralel olaraq insanın özü haqqında təhrif olunmuş kompensator təsəvvürlərinin formalaşması;
- şəxsi xüsusiyyətlər sırasında yeni spesifik dəyərlər sisteminin formalaşması müəyyən edilib;
- ailədə, təhsil və ya peşə fəaliyyəti prosesində şəxsiyyətlərarası münasibətlər sisteminin pozulması;
- sərt rollu davranış strukturlarının formalaşması;
- yaşantılar üzrə transpersonal təcrübənin dəyəri və əhəmiyyəti haqqında təsəvvürlər sisteminin formalaşması.

4. Stasionar şəraitdə səmərəli reabilitasiya sistemi zədələnmiş şəxsiyyətin bütün səviyyələrinə təsir üzrə bərpəedici sosial-psixoloji tədbirləri əhatə etməlidir. Reabilitasiya sisteminin üç əsas elementi: reabilitasiya mühiti, reabilitasiya subyekti və qrup fəaliyyəti arasında uyğunlaşdırılmış qarşılıqlı təsir üzrə xüsusi psixoloji, pedaqoji və təşkilati səylərin göstərilməsi vacibdir. Bunun üçün psixoaktiv maddələrdən asılı olanların reabilitasiyası zamanı əsas diqqət şəxsiyyətin koqnitiv və idrak baxımından yanaşmasına cəmlənməlidir ki, burada onların öz potensialını, qorunub-saxlanan resurslarını və özünün pozulmuş şəxsiyyət sferalarını dərk etməyə, inkişaf etdirməyə və onları dəyişməyə olan hazırlığını özünün anlamasını nəzərdə tutulur.

5. Reabilitasiya prosesində şəxsiyyət yüksək dərəcədə uyğunlaşma və stabilləşmə istiqamətində mühüm transformasiya nümayiş etdirir, daxili və xarici konfliktliliyi azalır, sosial cəhətdən maraqlılığ artır, kommunikativ vərdişləri inkişaf edir, eləcə də onun məhsuldar fəaliyyəti əhəmiyyətli dərəcədə artır.

6. Transpersonal psixologiya metodları əsasında qurulan məşğələlər subyekt üçün əhəmiyyətli olan vəziyyətlərin yaranmasına şərait yaradır ki, bu da onun şəxsi inkişafına və daxili ahəng əldə etməsinə imkan verir.

7. Sosial-psixoloji reabilitasiyanın və refleksiyanın inkişafının nəticəsi kimi, özü haqqında təsəvvürlər və özünü hiss etmə arasında-
kı uyğunsuzluq aradan qalxır, şəxsiyyətin “Mən-konsepsiyası”nın
“dərk olunan və dərk olunmayan” hissələri bir-birinə yaxınlaşır və
normallaşır.

Tədqiqatın elmi-nəzəri və praktik əhəmiyyəti. Tədqiqatdan
alınmış nəticələr ümumi və klinik psixologiyanı, psixofiziologiyanı yeni
biliklərlə zənginləşdirir. Psixoaktiv maddələrdən asılı olan şəxslərdə şəxsiy-
yətin sosial-psixoloji izahı üçün sosial-psixoloji qanunauyğunluqların
müəyyənləşdirilməsinə və sistemləşdirilməsinə nail olunmuşdur. Tədqiqatın
nəticələrindən sosial psixologiya və klinik psixologiyanın, eləcə də
müəyyən xüsusi fənlərin tədrisində elmi-nəzəri mənbə kimi istifadə edil-
lə bilər. Tədqiqatda əldə olunmuş nəticələr psixoaktiv maddələrdən asılı
olan şəxslərin psixoterapiyasında, gənclərin sağlam həyat tərzinə bağlı
təربiyəsində istifadə oluna bilər. Yaradılmış konseptual əsaslar və tövsiy-
yələr bu sahədə çalışan mütəxəssislərin elmi və praktik fəaliyyətində,
maarifçilik işinin aparılmasında dəyərli mənbədir. Tədqiqat işinin mate-
riallarından elmi-metodik tövsiyələrin, dərslik və dərs vəsaitlərinin ha-
zırlanmasında, elmi işçilərin tədqiqat işlərində istifadə oluna bilər.

Tədqiqatın aprobasiyası və tətbiqi. Tədqiqatın nəticələri
müəllifin yerli və beynəlxalq elmi mətbuatda dərc olunmuş məqalə
və tezislərində əksini tapmışdır. Bakı Dövlət Universitetində mühazi-
rə və seminarlarda iş aparmışdır.

Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı. Bakı
Dövlət Universitetinin sosial və pedaqoji psixologiya kafedrası.

Dissertasiyanın struktur bölmələrinin ayrılıqda həcmi qeyd olunmaqla, dissertasiyanın işarə ilə ümumi həcmi. Dissertasiya işi
– titullar sahəsi - 362 işarə, mündəricat -1052 işarə, giriş – 15157 işarə,
I fəsil – 61439 işarə, II fəsil – 111978 işarə, III fəsil – 49049 işarə,
nəticə – 28402 işarədən ibarətdir. İşin ümumi həcmi – 287927
işarədir.

İŞİN ƏSAS MƏZMUNU

Girişdə problemin aktuallığı, onun işlənmə səviyyəsi əsaslandırılır, tədqiqatın məqsəd və vəzifələri, obyektı və predmeti, fərziyyəsi, metodları, elmi yeniliyi, tədqiqatın nəzəri və praktik əhəmiyyəti müəyyənləşdirilir və müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar təqdim edilir.

Dissertasiyanın **“Psixoaktiv maddə asılılığının sosial-psixoloji tədqiqinə dair elmi araşdırmalar”** adlanan birinci fəslı iki yarımfəsilədən ibarətdir. Birinci fəslin **“Psixoaktiv maddələrdən asılılığın formalaşması prosesi”** adlı birinci paragrafında psixologiyada əsas elmi yanaşmaların nümayəndələri tərəfindən maddə asılılığı ilə bağlı irəli sürdükələri müdəallara aydınlıq gətirilir. Burada bu anlayışının məzmunu açıqlanır, bu sahədə aparılmış psixoloji tədqiqatlar sistemləşdirilir, yəni problemi öyrənməyə çalışmış tədqiqatçıların əsərləri təhlil olunur, adaptasiya anlayışının genezisi aydınlaşdırılır. Qeyd olunur ki, maddə asılılığı prosesinə müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. Psixoaktiv maddələrdən istifadəçilərinin psixoloji xüsusiyyətləri araşdırılmış, psixoaktiv maddə qəbulundan sonrakı dövrdəonların yaşadığı psixopatoloji hallar sosial-psixoloji aspektdən araşdırılmış, bu sahədə aparılmış tədqiqatların nəticələri haqqında qeydlər edilmişdir. Eyni zamanda psixoaktiv maddələrdən asılılığın yaratdığı sosial-psixoloji problemlər geniş şəkildə müəllif tərəfindən şərh edilmişdir.¹

Birinci fəslin **“Asılı şəxslərdə özünü göstərən sosial-psixoloji dəyişikliklər”** adlı ikinci yarımfəslində asılı şəxslərdə özünü göstərən sosial-psixoloji dəyişikliklərin mexanizmlərinə aydınlıq gətirilmişdir. asılılıq anlayışı, addiktiv davranış, psixoaktiv maddələrdən asılı olan şəxslərdə asılılığın müxtəlif mərhələlərində baş verən şəxsiyyət və sosial-psixoloji dəyişikliklərin dinamik inkişafı, psixoaktiv maddələrdən istifadə zamanı yaranan psixoloji asılılıq probleminə elmi yanaşmalar, asılılıq üzrə aparılmış elmi tədqiqatların müasir vəziyyəti təhlil olunur. Bu yarımfəsilə eyni zamanda asılılığın tədqiqi istiqamətlərinə aydınlıq gətirilir və sistemləşdirir.

Dissertasiyanın **“Psixoaktiv maddələrdən asılı olan şəxslərin**

¹ Mars, S.G. Every 'never' I ever said came true: transitions from opioid pills to heroin injecting / S.G.Mars, P.Bourgois, G.Karandinos [et al.] // International Journal of Drug Policy, -2014. №25 (2), -p. 124.

sosial-psixoloji reabilitasiya prosesinin təşkili” adlanan ikinci fəslə üç yarımfəsildən ibarətdir. sosial-psixoloji reabilitasiya prosesinin təşkili, psixoaktiv maddə istifadəçilərinin sosial-psixoloji reabilitasiyası sahəsində sistemli nəzəriyyələr və mövcud problemə dair elmi yanaşmalar, reabilitasiya gedişində tətbiq edilən müxtəlif metodlar, texnikalar, proqramlar, terapiyalar və reabilitasiya şəraitinin əsas xüsusiyyətlərinin təhlilinə dair məsələlər təhlil olunur və sosoail-psixoloji aspektləri öyrənilir. Alkoqol və psixoaktiv maddələrdən asılı olan şəxslərin psixoloji reabilitasiyasının əsasını onların davranışlarının dəyişdirilməsi və sağalmağa doğru irəliləmə üzrə motivasiya işi, eləcə də residivin profilaktikası təşkil edir.

İkinci fəslin ikinci yarımfəsli “Sosial-psixoloji reabilitasiya prosesinə hazırlıq və Motivasiyaedici Görüş texnikasının həyata keçirilmə qaydaları” adlanır. Bu yarımfəsildə Psixoaktiv maddə asılılığı olan şəxs öz düşüncə və həyat tərzində köklü dəyişikliklərin zəruriliyini dərk etməzsə, bu zaman qeyd edilənlər əsasında aparılan müalicə və reabilitasiya uğurlu olmayacaqdır. Asılılığı aradan qaldırmaq uzunmüddətli və bir neçə xüsusi mərhələdən ibarət bir prosesdir. Hər mərhələdə müəyyən vəzifələr həll olunmalı və müəyyən bacarıqlar inkişaf etdirilməlidir. Psixoaktiv maddədən asılı olan şəxs bu istiqamətdə daim irəliləməyə, qarşıya qoyulmuş məsələləri tam şəkildə yerinə yetirməyə və məqsədlərə çatmağa hazır deyilsə, dəyişikliklərdən davamlı çəkinirsə və bu problemi effektiv şəkildə aradan qaldırmağa çalışmırsa, o zaman qəza qaçılmazdır. Bununla əlaqədar olaraq, şəxsin sağlamlığının bütün mərhələ və pillələrində motivasiya üzərində iş aparmağın zəruriliyi meydana çıxır. Bu baxımdan bu fəsilin araşdırılması və təhlil olunması çox vacib meydana.

İkinci fəslin “Reabilitasiya prosesində tətbiq edilən müxtəlif metodlar və reabilitasiya şəraitinin əsas xüsusiyyətlərinin təhlili” adlanan üçüncü yarımfəsildə Bu fəsildə psixoaktiv maddələrdən asılı olan şəxslərin sosial-psixoloji reabilitasiya prosesinin təşkili ilə bağlı sosial psixoloji məsələlər təhlil edilmişdir. Bu fəsildə müəllif tərəfindən sosial-psixoloji reabilitasiya prosesində sistemli nəzəriyyələr və mövcud problemə dair elmi yanaşmalar təhlil edilərək sistemləşdirilmişdir. Eyni zamanda sosial-psixoloji reabilitasiya prosesinə hazırlıq və motivasiyaedici görüş texnikasının həyata keçirilmə qaydaları şərh edilmiş,

reabilitasiya prosesində tətbiq edilən müxtəlif metodlar və reabilitasiya şəraitinin əsas xüsusiyyətlərinin təhlili verilmişdir.¹

Dissertasiyanın “Psixoaktiv maddə istifadəçilərinin sosial-psixoloji reabilitasiyası prosesinin tədqiqi” adlanan üçüncü fəslə müəllifin apardığı elmi tədqiqatın təsviri, təhlili və şərhinə həsr edilmişdir. Üçüncü fəslin “Tədqiqatın təşkili, keçirilməsi və təhlili” adlanan birinci yarım fəslində tədqiqat prosesində istifadə olunan üsullar təsvir olunur. Bu tədqiqatda Bakı şəhərində yerləşən Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Respublika Narkoloji Mərkəzində stasionar şəraitdə müalicə alan 18-55 yaş aralığında 200 nəfər psixoaktiv maddələrdən asılı olan şəxs iştirak etmişdir. Sonda əldə edilmiş nəticələrin kəmiyyət və keyfiyyət təhlili aparılmış, yekun nəticələrin işlənilməsində SPSS-21 riyazi-statistik proqramından istifadə edilmişdir.

Üçüncü fəslin ikinci yarım fəslə “Tədqiq olunanların sosial-demografik əlamətləri və psixoloji vəziyyətin təyini” adlanır. Bu yarım fəslə tədqiqatın nəticələri təhlil olunur. Əvvəlcə demoqrafik göstəricilərin statistik təhlili verilmişdir ki, bu da müxtəlif amillərin təsir dərəcəsinin aydınlaşdırılmasında mühüm rol oynayır. Sorğular vasitəsilə şəxsiyyətin psixoaktiv maddələrdən asılılığının təşəkkülü, inkişafı və bu inkişafa təsir göstərən amilləri şərh edir. Müəllif bu cür davranışın yaranmasının səbəblərini sadəcə olaraq sadalamaqla kifayətlənmir, onların aradan qaldırılması yollarını, bu istiqamətdə böyük əhəmiyyət kəsb edən psixopofilaktik, reabilitasiya tədbirləri haqqında məlumat verir.

Üçüncü fəslin üçüncü yarım fəslə “Psixoaktiv maddə istifadəçiləri ilə aparılan sosial-psixoloji iş zamanı alınan nəticələr və onların praktik əhəmiyyəti” adlanır.

Onu da qeyd etmək ki, tədqiq olunanların eksperimental və kontrol qrup üzrə demoqrafik əlamətlərini əks etdirən bütün bu göstəricilər cədvəl 1-də öz əksini tapmışdır. Buna görə də cədvəl 1-ə ətraflı nəzər salaq.

¹ Miedl, S.F., Peters, J. & Buchel, C. Altered neural reward representations in pathological gamblers revealed by delay and probability discounting. // Archives of General Psychiatry, -2012. 69(2), -p.177.

Eksperimental və kontrol qrup tədqiq olunanların demoqrafik əlamətləri

Cədvəl 1

Demoqrafik xüsusiyyətlər		Eksperimental qrup		Kontrol qrup	
		N	%	N	%
Yaş	<i>18-25 yaş</i>	57	38%	21	42%
	<i>25 yaş və yuxarı</i>	93	62%	29	58%
Cinsiyyət	<i>Qadın</i>	22	15%	11	22%
	<i>Kişi</i>	128	85%	39	78%
Təhsil	<i>Ali</i>	83	55%	31	62%
	<i>Orta</i>	67	45%	19	38%
Mədəni durum	<i>Evli</i>	64	43%	22	44%
	<i>Subay</i>	41	27%	15	30%
	<i>Boşanmış</i>	45	30%	13	26%
Əmək fəaliyyəti	<i>Var</i>	28	19%	8	16%
	<i>Yox</i>	122	81%	42	84%
Övlad sayı	<i>Yoxdur</i>	82	55%	29	58%
	<i>1</i>	54	36%	15	30%
	<i>2 və daha artıq</i>	14	9%	6	12%
Toplam		150	100%	50	100%

Tədqiq olunanlara psixoaktiv maddələrdən istifadə etmələri ilə bağlı bəzi suallar verilmiş və əldə edilən nəticələr cədvəl 2-də qeyd edilmişdir. “Neçə ildir psixoaktiv maddələrdən istifadə edirsiniz?” sualına eksperimental qrupda tədqiq olunanların 20%-i “1 ildir”, 37%-i “2-7 ildir”, 43%-i isə “7 və daha yuxarı” cavablarını vermişlər. Kontrol qrupda isə eyni suala tədqiq olunanların 22%-i “1 ildir”, 46%-i “2-7 ildir”, 32%-i isə “7 və daha yuxarı” cavablarını vermişlər. “Birinci olaraq hansı maddədən istifadə etmisiniz?” sualına eksperimental qrupda tədqiq olunanların 60%-i kannabioiddən, 9%-i psixostimulyatorlardan, 7%-i opioiddən, 2%-i hallüsinogenlərdən, 4%-i depressantlardan, 18%-i alkoqollu içkilərdən sui-istifadə etməyə başladığını qeyd etmişdir. Kontrol qrupda isə tədqiq olunanların 42%-i kannabioiddən, 16%-i psixostimulyatorlardan, 6%-i opioiddən, 4%-i hallüsinogenlərdən, 8%-i tədqiq olunan depressantlardan, 24%-i alkoqollu içkilər vasitəsilə asılılığa başladığını qeyd etmişdir. “Hazırda hansı maddə ilə davam edirsiniz?” sualına eksperimental qrupda tədqiq olunanların 33%-i alkoqolla, 1%-i kannabiodla, 39%-i psixostimulyatorla, 20%-i opiatla, 5%-i hallüsinogenlə, 2%-i depressantlarla

davam etdiyini bildirmişdir. Eksperimental qrupda tədqiq olunanların 38%-i alkoqolla, 6%-i kannabiodla, 32%-i psixostimulyatorla, 12%-i opiadla, 8%-i hallüsinogenlə, 4%-i depressantlarla davam etdiyini bildirmişdir. “İlk dəfə neçə yaşında psixoaktiv maddə istifadə etmisiniz?” sualı anketin növbəti sualı idi. Tədqiqatın aparıldığı eksperimental qrup iştirakçılarının 59%-i “12-18 yaşından”, 29%-i “18-25 yaşından”, 12%-i isə “25-dən yuxarı yaşda” psixoaktiv maddə istifadə etməyə başladığını bildirmişdir. Kontrol qrupda tədqiq olunanların 62%-i bu suala “12-18 yaşından”, 22%-i “18-25 yaşından”, 16%-i isə “25-dən yuxarı yaşda” psixoaktiv maddə istifadə etməyə başladığını bildirmişdir. Aşkar edilmişdir ki, tədqiqata cəlb edilən eksperimental qrup iştirakçılarının 59%-i 12-18 yaşından, 29%-i 18-25 yaşında, 12%-i isə 25 yaşından yuxarı yaşda psixoaktiv maddə istifadə etməyə başlamışdır. Kontrol qrupda tədqiq olunanların isə 62%-i 12-18 yaşından, 22%-i 18-25 yaşında, 16%-i isə 25 yaşından yuxarı yaşda maddə istifadə etməyə başlamışdır.

Növbəti sualda isə tədqiq olunanlardan “hal-hazırkı müalicəniz aldığınız neçənci müalicədir?” deyə soruşulmuşdur. Eksperimental qrupda olan tədqiq olunanların 20%-i bu suala cavab olaraq onların ilk müalicəsi olduğunu, 65%-i 2-3-cü müalicəsi olduğunu, 15%-i isə 4 və daha artıq müalicəsi olduğunu qeyd etmişdir. Kontrol qrupdakı tədqiq olunanların 24%-i onların ilk müalicəsi, 56%-i 2-3-cü müalicəsi, 20%-i isə 4 və daha artıq müalicəsi olduğu cavabını vermişdir. Eksperimental qrupdakı tədqiq olunanların 51%-i müalicəyə məcburi, 14%-i real olaraq könüllü, 35%-i isə formal olaraq könüllü cəlb olunduğunu bildirmişdir. Kontrol qrupdakı tədqiq olunanların isə 54%-i məcburi, 18%-i real könüllü, 28%-i formal könüllü cəlb olunduğunu qeyd etmişdir. Eksperimental qrupdakı 17% tədqiq olunanın məhkumluğu var, 83% tədqiq olunanın isə məhkumluğu yoxdur, kontrol qrupdakı 12% tədqiq olunanın məhkumluğu var, 88% tədqiq olunanın isə məhkumluğu yoxdur. Bütün bu suallar üzrə göstəricilər öz əksini cədvəl 2-də tapmışdır.

Aşağıdakı qrafikdə tədqiq olunanların “Dəyişikliyə hazırlıq və müalicəyə sadıqlıq” şkalası üzrə maddə asılılığı müalicəsinə başlamaq üçün nə qədər hazır olduqları yoxlanılmışdır. Bu metod hər iki qrupa tətbiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, eksperimental qrupda

tədqiq olunanların 85%-i hələ ki, dəyişikliyə hazırlığın niyyətəqədər mərhələsindədir, 15%-i isə niyyət mərhələsindədir. Kontrol qrupdakı tədqiq olunanların 90%-i isə dəyişikliyə hazırlığın niyyətəqədər mərhələsindədir, 10%-i isə niyyət mərhələsindədir.


Eksperimental və kontrol qrup tədqiq olunanların demoqrafik əlamətləri

Cədvəl 2

		Eksperimental qrup		Kontrol qrup	
		N	%	N	%
Neçə ildir istifadəçidir?	1	29	20%	11	22%
	2-7	56	37%	23	46%
	7 və daha yuxarı	65	43%	16	32%
Hansı maddə ilə başlayıb?	Kannabiodlar	90	60%	21	42%
	Psixostimulyatorlar	13	9%	8	16%
	Opiatlar	10	7%	3	6%
	Hallusinogenlər	3	2%	2	4%
	Depresanlar	6	4%	4	8%
	Alkoqol	28	18%	12	24%
Hansı maddə ilə davam edir?	Alkoqol	50	33%	19	38%
	Kannabiodlar	2	1%	3	6%
	Psixostimulyatorlar	58	39%	16	32%
	Opiatlar	30	20%	6	12%
	Hallusinogenlər	7	5%	4	8%
	Depresanlar	3	2%	2	4%
İlk dəfə neçə yaşında istifadə edib?	12-18 yaş	88	59%	31	62%
	18-25 yaş	43	29%	11	22%
	25 yaş və daha yuxarı	19	12%	8	16%

Cədvəl 2-nin ardı

Neçənci müalicəsidir?	1	30	20%	12	24%
	2-3	97	65%	28	56%
	4 və daha artıq	23	15%	10	20%
Müalicəyə cəlb olunub	Məcburi müalicə	76	51%	27	54%
	Real könüllü	21	14%	9	18%
	Formal könüllü	53	35%	14	28%
Məhkumluğu	Var	26	17%	6	12%
	Yox	124	83%	44	88%
Toplam		150	100%	50	100%




Şəkil 1. Eksperimental və kontrol qrupda tədqiq olunanların “Dəyişikliyə hazırlıq və müalicəyə sadıqlıq” şkalası üzrə pre-test nəticələri

Tədqiqata qatılan könüllünün “Dəyişikliyə hazırlıq və müalicəyə sadıqlıq” şkalasının pre-test nəticəsi 19 baldır. Bu o deməkdir ki, tədqiq olunan dəyişikliyə hazırlığın niyyətəqədər mərhələsindədir.

Daha sonra tədqiq olunanları digər psixoloji aspektlərdən qiymətləndirmək üçün onlarla müxtəlif psixoloji testlər keçirilmiş və şkalalar tətbiq olunmuşdur. Aşağıdakı qrafikdə “Hamiltonun Təşviş Reytingi Cədvəli”nin nəticələri göstərilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, eksperimental qrupda tədqiq olunanların 5%-də yüngül dərəcəli

təşviş pozuntusu, 13%-də orta dərəcəli, 82%-də isə ağır dərəcəli təşviş pozuntusu qeydə alınmışdır. Kontrol qrupda isə nəticələr bu cür olmuşdur. Belə ki, tədqiq olunanların 8%-də yüngül dərəcəli təşviş pozuntusu, 26%-də orta dərəcəli, 66%-də isə ağır dərəcəli təşviş pozuntusu müəyyən edilmişdir. Dediklərimizi qrafik 2-də aydın şəkildə görmək mümkündür.




Şəkil 2. Eksperimental və kontrol qrup tədqiq olunanların “Hamiltonun Təşviş Reytingi” cədvəlinin pre-test nəticələri

Qrafik 3-də “Hamiltonun Depressiya Reytingi Cədvəli”nin nəticələri verilmişdir. Alınan nəticələrə görə tədqiq olunanların eksperimental qrupda nəticələri aşağıdakı kimi olmuşdur: iştirakçıların 1%-i normadadır, 9%-də yüngül dərəcəli depressiv pozuntu, 14%-də orta dərəcəli, 20%-də ağır dərəcəli, 56%-də kəskin dərəcəli depressiv pozuntu özünü göstərir. Kontrol qrupda tədqiq olunanların heç birində nəticələr normal olmamışdır. Bundan başqa, onların 4%-də yüngül dərəcəli depressiv pozuntu, 8%-də orta dərəcəli, 24%-də ağır dərəcəli, 56%-də kəskin dərəcəli depressiv pozuntu müşahidə edilmişdir. Bütün bu qeyd etdiyimiz nəticə göstəriciləri də qrafik 3-də aydın şəkildə təsvir edilmişdir ki, onlara da aşağıda nəzər salmaq mümkündür.

Növbəti bənddə tədqiq olunanların dəyişikliyə istəkliliyi və müalicəyə sadıqlığı ilə fobiya təşviş alt şkalası arasındakı əlaqəyə baxılmışdır, burada statistik əhəmiyyətli tərs mütənəsb əlaqə olduğu

müəyyən edilmişdir ($p < 0,05$). Tədqiq olunanın fobiya təşviş səviyyəsi artdıqca dəyişikliyə istəyi və müalicəyə sadıq qalması azalmağa başlayır və ya əksinə. Spearman korrelyasiyasına görə dəyişikliyə istəkliliyi və müalicəyə sadıqlıq ilə paranoid düşüncə arasında statistik olaraq tərs istiqamətdə güclü əlaqə mövcuddur ($p < 0,05$). Bu, o deməkdir ki, tədqiq olunanlarda paranoid düşüncə artdıqca dəyişikliyə istəklilik azalır. Psixotizm alt şkalası ilə dəyişikliyə istəklilik və müalicəyə sadıqlıq şkalası arasında apardığımız təhlillər zamanı aşkar edilmişdir ki, statistik olaraq əks istiqamətdə əhəmiyyətli əlaqə mövcuddur ($p < 0,05$). Tədqiqata cəlb edilən iştirakçılarda psixotizm əlamətləri artdıqca dəyişikliyə istəklilik və müalicəyə sadıqlığı azalır və ya əksinə, psixotizm əlamətləri azaldıqca dəyişikliyə istəklilik və müalicəyə sadıqlıq artır. Bütün bunlar cədvəl 3-də öz əksini tapmışdır.



Şəkl. 3. Eksperimental və kontrol qrupda tədqiq olunanların “Hamiltonun Depressiya Reytinqi” cədvəli üzrə pre-test nəticələri

Cədvəl 3-də eksperimental qrupda “Dəyişikliyə istəklilik və müalicəyə sadıqlıq” şkalası ilə demoqrafik əlamətlərin qarşılaşdırılması göstərilmişdir. Bu qarşılaşdırma zamanı Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis H və Anova testinin nəticələrinə baxılmışdır. Mann-Whitney U testinin nəticələrinə görə, tədqiq olunanların dəyişikliyə

istəyi və müalicəyə davamlılığı ilə yaşı arasında statistik əhəmiyyətli əlaqə müəyyən edilmişdir ($p < 0,05$).

Eksperimental qrupda “Dəyişikliyə istəklilik və müalicəyə sadıqlıq” şkalası ilə “Qısa simptom envanteri” arasında Spearman korrelyasiya əlaqələrinin nəticələri

Cədvəl 3

Dəyişikliyə istəklilik və müalicəyə sadıqlıq şkalası		
Somatizasiya		-0,101**
		0,000
		145
Obsessiv-kompulsiv		-0,224**
		0,000
		145
Şəxsiyyətlərarası münasibətlər		0,187**
		0,002
		145
Depressiya		-0,387**
		0,000
		145
Təşviş pozuntusu		-0,423**
		0,000
		145
Kin, düşmənçilik		-0,324**
		0,000
		145
Fobiyalı təşviş		-0,223**
		0,004
		145
Paranoid düşüncə		-0,121**
		0,000
		145
Psixotizm		-0,116**
		0,000
		145

Tədqiq olunanların neçə ildir istifadəçi olması ilə dəyişikliyə istəyi və müalicəyə davamlılığı arasında əlaqəyə də baxılmışdır. Anova testinin nəticələrinə görə, tədqiq olunanların neçə ildir istifa-

dəçi olması ilə dəyişikliyə istəyi və müalicəyə davamlılığı arasında statistik əhəmiyyətli güclü əlaqə mövcuddur ($p < 0,05$). Belə ki, müəyyən edilmişdir ki, il sayı artdıqca dəyişikliyə istək də azalmağa başlayır. 1 il maddə istifadəçisi olan tədqiq olunanlar 2-3 ildir, 4 və daha artıq il istifadəçi olan tədqiq olunanlara nisbətən dəyişikliyə daha çox istəklidirlər. 2-3 il istifadəçi olan qrup da 4 və daha artıq il istifadəçi olan tədqiq olunanlara nisbətən daha çox dəyişikliyə istekli və müalicəyə sadıqdırlar.

Apardığımız tədqiqat bizə aşağıdakı nəticələrə gəlməyə imkan verir:

“Şəxsin Sağlamlığının Qiymətləndirilməsi (HONOS)” şkalası üzrə pre-test nəticələri belə olmuşdur: tədqiq olunanların eksperimental qrupunun 1%-ində problem yoxdur və ya cüzi problem vardır, 5%-də yüngül dərəcədə ifadə olunmuş problem, 25%-də orta dərəcədə ifadə olunmuş problem, 69%-də ağır dərəcədə ifadə olunmuş problem müşahidə edilmişdir. Kontrol qrupda tədqiq olunanların heç birində nəticələr norma daxilində olmamışdır, bundan başqa, tədqiq olunanların 6%-də yüngül dərəcədə ifadə olunmuş problem, 36%-də orta dərəcədə ifadə olunmuş problem, 58%-də ağır dərəcədə ifadə olunmuş problem özünü göstərmişdir.

Bu şkala üzrə tədqiq olunanlar arasında keçirilmiş post-test nəticələri bu cür olmuşdur ki, eksperimental qrup iştirakçılarının 67%-ində problem yoxdur və ya cüzi problem vardır, 25%-də yüngül dərəcədə ifadə olunmuş problem, 6%-də orta dərəcədə ifadə olunmuş problem, 2%-də ağır dərəcədə ifadə olunmuş problem müşahidə edilmişdir. Kontrol qrupda tədqiq olunanların heç birində nəticələr norma daxilində olmamışdır, 4%-də yüngül dərəcədə ifadə olunmuş problem, 23%-də orta dərəcədə ifadə olunmuş problem, 73%-də ağır dərəcədə ifadə olunmuş problem özünü göstərmişdir.

Qısa Simptom Envanterinin nəticələri aşağıdakı kimi olmuşdur:

Pre-test nəticələri: somatizasiya şkalasında eksperimental qrupda 7% tədqiq olunan normal, 8% tədqiq olunan aşağı, 23% tədqiq olunan orta, 62% tədqiq olunan isə ağır dərəcədə somatizasiya problemi yaşayır, kontrol qrupda isə 6% tədqiq olunanda normal, 22% tədqiq olunanda aşağı, 28% tədqiq olunanda orta, 44% tədqiq olu-

nanda isə ağır dərəcədə somatizasiya problemi müşahidə edilmişdir.

Post-test nəticələri: somatizasiya alt şkalasının nəticələrinə görə müəyyən edilmişdir ki, eksperimental qrupda 70% tədqiq olunan normal, 21% tədqiq olunan aşağı, 5% tədqiq olunan orta, 4% tədqiq olunan isə ağır dərəcədə bu problemi yaşayır, kontrol qrupda isə 4% tədqiq olunanda normal, 25% tədqiq olunanda aşağı, 29% tədqiq olunanda orta, 42% tədqiq olunanda isə ağır dərəcədə somatizasiya problemi müşahidə edilmişdir.

Obsessiv kompulsiv pozuntu alt şkalası üzrə pre-test nəticələri: eksperimental qrupda tədqiq olunanların 9%-i normaldır, 10%-i aşağı, 23%-i orta, 58% tədqiq olunan isə ağır dərəcədə obsessiv-kompulsiv pozuntu yaşayır. Kontrol qrupda tədqiq olunanların 10%-i normal nəticə göstərmiş, 18% tədqiq olunanda aşağı 32% tədqiq olunanda orta, 40% tədqiq olunanda isə ağır dərəcədə obsessiv-kompulsiv pozuntu müşahidə edilmişdir.

Bu alt şkala üzrə post-test nəticələri isə belə olmuşdur: obsessiv-kompulsiv pozuntu alt şkalasının nəticələrinə görə isə eksperimental qrupda tədqiq olunanların 39%-i normaldır, 33%-i aşağı, 15%-i orta, 13%-i isə ağır dərəcədə obsessiv-kompulsiv pozuntu yaşayır. Kontrol qrupda 8% tədqiq olunan normal, 21% tədqiq olunanda aşağı, 27% tədqiq olunanda orta, 44% tədqiq olunanda isə ağır dərəcədə obsessiv-kompulsiv pozuntu müşahidə edilmişdir.

Pre-test nəticələri: eksperimental qrupda tədqiq olunanların heç birinin şəxsiyyətlərarası münasibətlərində normal səviyyə müşahidə edilməmişdir, bundan başqa, tədqiq olunanların 1%-i aşağı, 16%-i orta, 83%-i isə ağır dərəcədə şəxsiyyətlərarası münasibətlərlə bağlı problemlər yaşayır. Kontrol qrupda tədqiq olunanların heç birinin şəxsiyyətlərarası münasibətlərində normal və aşağı dərəcədə problemə rast gəlinməmişdir, tədqiq olunanların 22%-i orta, 78%-i ağır dərəcəli şəxsiyyətlərarası münasibətlər problemi yaşayır.

Post-test nəticələri isə bu cür olmuşdur: eksperimental qrupda tədqiq olunanların 60%-i normal nəticə göstərmiş, şəxsiyyətlərarası münasibətlərlə bağlı tədqiq olunanların 21%-i aşağı, 7%-i orta, 23%-i isə ağır dərəcədə problemlər yaşayır. Kontrol qrupda tədqiq olunanların heç birində normal dərəcəli şəxsiyyətlərarası münasibətlərə rast gəlinməmişdir, tədqiq olunanların 4%-i aşağı, 23%-i orta, 73%-i ağır dərəcəli

şəxsiyyətlərarası münasibətlər problemi yaşayır.

Pre-test nəticələri-eksperimental qrupda tədqiq olunanların 2%-i normaldır, 11%-də aşağı, 13%-də orta, 74%-də ağır depressiya müşahidə edilmişdir. Kontrol qrupda isə 2%-də aşağı, 26%-də orta, 72%-də ağır depressiya müşahidə edilmişdir. Kontrol qrupda depressiyanın normal səviyyəsi müşahidə edilməmişdir.

Post-test nəticələri-eksperimental qrupda tədqiq olunanların 61%-i normal nəticə göstərmiş, bundan başqa, tədqiq olunanların 13%-də aşağı, 6%-də orta, 20%-də ağır depressiya müşahidə edilmişdir. Kontrol qrupda isə tədqiq olunanların 4%-də aşağı, 21%-də orta, 75%-də ağır depressiya müşahidə edilmişdir. Kontrol qrupda depressiyanın normal səviyyəsi müşahidə edilməmişdir.

Eksperimental qrupda tədqiq olunanların təşviş pozuntusu 5%-də aşağı dərəcəli, 9%-də isə orta dərəcəli, 85%-də ağır dərəcəli təşviş pozuntusu qeydə alınmışdır. Kontrol qrupda isə nəticələr belə olmuşdur: tədqiq olunanların 8%-də aşağı dərəcəli təşviş pozuntusu, 24%-də orta dərəcəli, 68%-də isə ağır dərəcəli təşviş pozuntusu müəyyən edilmişdir. Kontrol qrupda təşviş pozuntusunun normal səviyyəsi müşahidə edilməmişdir.

Post-test nəticələri-eksperimental qrupda tədqiq olunanların 60%-də normal dərəcəli təşviş pozuntusu, 17%-də aşağı dərəcəli, 7%-də isə orta dərəcəli, 16%-də ağır dərəcəli təşviş pozuntusu qeydə alınmışdır. Kontrol qrupda isə nəticələr belə olmuşdur: təşviş pozuntusunun normal səviyyəsi müşahidə edilməmişdir. Tədqiq olunanların 6%-də aşağı dərəcəli təşviş pozuntusu, 29%-də orta dərəcəli, 65%-də isə ağır dərəcəli təşviş pozuntusu müəyyən edilmişdir.

Pre-test nəticələri-eksperimental qrupda tədqiq olunanlar arasında paranoid düşüncə şkalası üzrə əldə olunan nəticələrə görə aşka redilmişdir ki, 1% tədqiq olunan normal, 8% tədqiq olunan aşağı, 23% tədqiq olunan orta, 68% tədqiq olunan ağır dərəcədə paranoid pozuntu yaşayır. Kontrol qrupda tədqiq olunanların 2%-i normal, 6% tədqiq olunanda aşağı, 14% tədqiq olunanda orta, 78% tədqiq olunanda isə ağır dərəcədə paranoid pozuntu aşkar edilmişdir.

Post-test nəticələri-eksperimental qrupda tədqiq olunanların paranoid düşüncə şkalası üzrə nəticələrinə görə, 53% tədqiq olunan normal, 28% tədqiq olunan aşağı, 8% tədqiq olunan orta, 11% tədqiq

olunan ağır dərəcədə paranoid pozuntu yaşayır. Kontrol qrupda tədqiq olunanların 6%-i aşağı, 15%-i orta, 79%-i isə ağır dərəcədə paranoid pozuntu nümayiş etdirmişdir. Bu qrupda tədqiq olunanların normal səviyyəsinə rast gəlinməmişdir.

Pre-test nəticələri-eksperimental qrupda psixotizmin normal səviyyəsində olan tədqiq olunana rast gəlinməmişdir. Bundan başqa, 4% tədqiq olunanda aşağı, 19% tədqiq olunanda orta, 77% tədqiq olunanda isə ağır dərəcədə psixotizm əlamətlərinə rast gəlinmişdir. Kontrol qrupdakı tədqiq olunanlar arasında da eksperimental qrupdakı kimi psixotizmin normal səviyyəsi müşahidə edilməmişdir. Bundan əlavə, 4% tədqiq olunanda aşağı, 20% tədqiq olunanda orta, 76% tədqiq olunanda isə ağır dərəcədə psixotizm əlamətləri aşkar edilmişdir.

Post-test nəticələri-eksperimental qrupda tədqiq olunanların 39%-ində normal psixotizm aşkar edilmişdir, 36% tədqiq olunanda aşağı, 21% tədqiq olunanda orta, 4% tədqiq olunanda isə ağır dərəcədə psixotizm əlamətlərinə rast gəlinmişdir. Kontrol qrupda tədqiq olunanların 6%-ində normal səviyyə, 21%-ində aşağı, 73%-ində orta, 4%-ində isə ağır dərəcədə psixotizm əlamətləri aşkar edilmişdir.

Mann-Whitney U testinin nəticələrinə görə, tədqiq olunanların əmək fəaliyyəti ilə dəyişikliyə istəyi və müalicəyə davamlılığı arasında statistik əlaqə müəyyən edilməmişdir ($p>0,05$).

Anova testinin nəticələrinə görə, tədqiqata cəlb edilən tədqiq olunanların övlad sayı ilə dəyişikliyə istəyi arasında statistik anlamlı bir əlaqə mövcuddur ($p<0,05$). Belə ki, 2 və daha artıq övladı olan tədqiq olunanlar 1 övladı olan və heç övladı olmayan tədqiq olunanlara nisbətən dəyişikliyə daha çox istəklidirlər, 1 övladı olan tədqiq olunanlar isə heç övladı olmayanlara nisbətən daha çox dəyişikliyə istəklidirlər.

**Dissertasiyanın əsas məzmunu müəllifin
aşağıdakı çap olunmuş əsərlərində öz əksini tapmışdır:**

1. Allahverdiyev, R.F. Psixoaktiv maddə qəbulunun insanda yaratdığı psixi və fiziki asılılıqların təhlili //Bakı Dövlət Universitetinin Psixologiya Jurnalı. - Bakı: -2016, №3, - s. 22-29.
2. Allahverdiyev, R.F. Psixoaktiv maddə istifadəçilərinin reabilitasiyasının konseptual əsasları //Bakı Dövlət Universitetinin. Psixologiya Jurnalı. - Bakı: 2018, №2, - s.24-34.

3. Allahverdiyev, R.F. Psixoaktiv maddələrdən istifadə zamanı yaranan psixoloji asılılıq probleminə elmi yanaşmalar // Bakı Qızlar Universitetinin. Elmi Əsərlər jurnalı. - Bakı: -2019, №1, - s. 234-247.
4. Allahverdiyev, R.F., Javadi Kyan, T., Məmmədov, X.T. Psixoaktiv maddə istifadəçilərinin sosial-psixoloji reabilitasiyasında koqnitiv davranış terapiyasının həyata keçirilməsi qaydaları və tətbiqi yolları // Bakı Dövlət Universitetinin. Psixologiya jurnalı. - Bakı: -2020, №1, - s. 38-58.
5. Mustafayev, M.H., Allahverdiyev, R.F. Psixoaktiv maddə istifadəçilərinin sosial-psixoloji reabilitasiyasında həyata keçirilən terapiya üsulları və müasir yanaşmalar. // Bakı Dövlət Universitetinin. Psixologiya jurnalı. - Bakı: -2020, №2, - s. 55-65.
6. Allahverdiyev, R.F., Javadi Kyan, T., Məmmədov X.T. Metadonla müalicə olunan maddə istifadəçilərinə koqnitiv davranış qrup terapiyası metodu ilə təşvişin və stressin idarə olunması. //Bakı Qızlar Universitetinin. Elmi Əsərlər jurnalı. - Bakı: -2020, №1, - s. 102-105.
7. Аллахвердиев, Р.Ф. Исследование эффективности управления тревогой и стрессом посредством когнитивно-поведенческой групповой терапии у лиц употребляющих психоактивные вещества и лечащихся методом. // Причорноморський Науково-Дослідний Інститут Економіки Та Інновацій.Науковий Журнал "ГАБІТУС", - 2022, №36, - с. 103-109.
8. Allahverdiyev, R.F. Psixoaktiv maddə asılılığının reabilitasiyasında həyata keçirilən Motivasiyaedici Görüş Metodunun nəzəri təhlili və tətbiqi qaydası. / Psixologiyanın aktual problemlərinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans. Qərbi Kaspi Universiteti. - Bakı: -2021, - s. 29-36.
9. Allahverdiyev, R.F. Psixoaktiv maddə istifadəçilərinin sosial-psixoloji reabilitasiyası problemi. / Psixologiya zirvəsi: problemlər, perspektivlər və yeni yanaşmalar. Beynəlxalq Elmi-Praktik konfransın materialları. - Bakı: -2020, №1, - s. 85-86.
10. Allahverdiyev, R.F. Social-psychological rehabilitation of psychoactive substance users // Наука и образование в условиях цифровой трансформации: сборник научных трудов. - Казань: -2023, №1, - с. 7-14.

11. Аллахвердиев, Р.Ф. Когнитивно поведенческая терапия для зависимых от психоактивных веществ: степень разработанности и правила применения в реальности. / LXI Международная научно-практическая конференция. «Научный форум: инновационная наука». -Москва: -2023, - с. 18-23.



Dissertasiyanın müdafiəsi 30 may 2025-ci il tarixində saat 14⁰⁰-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.43 Dissertasiya şurasının iclasında keçiriləcək.

Ünvan: AZ1148, Bakı şəhəri, Akademik Zəhid Xəlilov küçəsi 33, 2 saylı tədris korpusu, 203-cü auditoriya, e-mail: info@bsu.edu.az

Dissertasiya ilə Bakı Dövlət Universitetinin kitabxanasında tanış olmaq mümkündür.

Avtoreferatın elektron versiyası Bakı Dövlət Universitetinin rəsmi internet saytında yerləşdirilmişdir: <http://bsu.edu.az>.

Avtoreferat 28 aprel 2025-ci il tarixində zəruri ünvanlara göndərilmişdir.

Çapa imzalanıb: 15.04.2025
Kağızın formatı: 60x84 1/16
Həcm: 41528
Tiraj: 100